

MR vizsgálati lelet

Páciens neve: MEX, 2.5 éves mopsz, kan

Tulajdonos: Cseh Roberta, 9241 Jánossomorja, Domb u. 14.

Vizsgálat ideje: 2020. április 3.

Beküldő állatorvos: dr. Farkas Nikolett, Ergényi Állatorvosi Rendelő

A teljes gerincoszlopról, valamint myelonról sagittalis T2 FSE, sagittalis T1 FSE, a thoracolumbalis szakaszcól dorsalis T2 FSE, az elváltozást mutató szakaszokról transversalis T2 FSE szekvencia készült. A vizsgálat GE 1.5 T berendezéssel készült.

Th2-Th10, Th12-Th13 intervertebrális porckorongok kivételével valamennyi intervertebrális porckorong T2 és T1 súlyozott szekvencián normális jelintenzitású, alakjuk megtartott. A kivételt képező porckorongok T2 súlyozott szekvencián enyhén csökkent jelintenzitásúak, degeneráltak.

Th11-L1 szakaszon enyhe kyphosis látható.

C3 csigolya síkjában minimális mértékű, dorsalis arachnoideális diverticulum látható, szignifikáns myelon-kompressziót nem okozva. A C2-C3 csigolya síkjában a myelon kissé heterogén szerkezetű, T2 súlyozott szekvencián elmosódott határral kissé fokozott jelintenzitású. C2-C3 intervertebrális porckorong bedomborodása látható (bulging), liquortér-kompressziót okozva.

Th3 csigolya caudalis véglemezének síkjától Th4 csigolya caudalis harmadának síkjáig tartó szakaszon, körülbelül 9 mm hosszan az arachnoideális tér tágulata látható a gerinccsatorna bal dorsolaterális (körülbelül 2 mm), jobb ventrolaterális (körülbelül 2 mm) és jobb dorsolaterális (körülbelül 3 mm) területén. Összességében közepesen súlyos myelon-kompresszió látható, legnagyobb mértékben a myelon jobb dorsolaterális területét érintően. Th5 csigolya síkjában a myelon szerkezete heterogén, T2 súlyozott szekvencián fokozott jelintenzitású.

A C2 csigolya síkjában a nyak jobb oldalán a bőr alatti kötőszövetben egy tojásdad alakú, körülbelül 18 X 13 mm nagyságú, éles határvonalú, homogén szerkezetű, T2 súlyozott szekvencián fokozott jelintenzitású képlet látható.

Vélemény:

1. Th3-Th4 szakaszon közepesen súlyos myelon-kompresszió, jobb oldali túlsúllyal; arachnoideális diverticulum. Th5 csigolya síkjában myelopathia.
2. C3 csigolya síkjában minimális dorsalis arachnoideális diverticulum, C2-C3 intervertebrális rés síkjában minimális mértékű myelopathia; discus bedomborodás (bulging).
3. Tértfoglaló képlet a nyak jobb oldalán a bőr alatti kötőszövetben.

4. Th11-L1 szakaszon enyhe kyphosis.

Budapest, 2020. április 3.

dr. Kerekes Zoltán, dr. Zsámbéki Eszter

[Vetscan Kisállat Diagnosztika](#)