

MR-vizsgálati lelet

Páciens neve: BRÚNÓ, 11 hónapos biewer yorkshire terrier, kan

Tulajdonos: Sebestyén Éva, 4031 Debrecen, Derék utca 255. 4/11.

Vizsgálat ideje: 2021. augusztus 11.

Beküldő állatorvos: dr. Rideg Ádám, Vezér Állategészségügyi Centrum

A teljes gerincoszlopról, valamint a myelonról sagittális T2 FSE, sagittális T1 FSE, a thoracolumbalis szakaszból dorsalis T2 FSE, az elváltozást mutató szakaszokról transversális T2 FSE szekvencia készült. A vizsgálat GE 1.5 T berendezéssel készült.

Th5-Th6, Th8-Th9 intervertebrális porckorongok kivételével valamennyi intervertebrális porckorong T2 súlyozott szekvencián normális jelintenzitású, alakjuk megtartott. A kivételt képező porckorongok T2 súlyozott szekvencián súlyos mértékben csökkent jelintenzitásúak; dehidrááltak.

13 bordapár és 7 lumbális csigolya látható.

Th8-Th9 intervertebrális porckorong extrúziója látható a gerinccsatorna ventralis, jobb ventrolateralis, jobb laterális részébe, közepesen súlyos myelonkompressziót okozva. A porckorong anyaga az intervertebrális rés síkjától cranialisan, körülbelül 3 mm hosszan nyomul a gerinccsatorna jobb ventrolateralis és jobb laterális részébe, enyhe myelonkompressziót okozva. Az intervertebrális rés síkjában a myelon kissé heterogén szerkezetű, T2 súlyozott szekvencián fokozott jelintenzitású.

Összegzés:

1. Th8-Th9 közepesen súlyos myelonkompresszió; jobb oldali discus extrúzió; fokális myelopathia. A porckorong anyaga az intervertebrális rés síkjától cranialisan a gerinccsatornában.

Budapest, 2021. augusztus 11.

dr. Kerekes Zoltán, dr. Zsámbéki Eszter

Vetscan Képalkotó Diagnosztika

