



FuzioVet Állatkórház

1112 Budapest, Budaörsi út 146.

Tel.: +36 30 469 9459

E-mail: info@fuziovet.hu

Web: www.fuziovet.hu

CT vizsgálati lelet

Állat kód: 170864

Tulajdonos: Kálmán Adrienn

Páciens:

Név: Loli

Faj: kutya

Fajta: keverék

Születési dátum: 2012.05.20.

Ivar: i. szuka

Testtömeg: 17,5 kg

Vizsgálat dátuma: 2023.04.27.

Anamnesis / klinikai tünetek



Köhögés, felületes szapora légzés.


Képalkotó lelet

A mellkasról és hasról natív és kontrasztos CT vizsgálat készült.

Mellkas:

A tüdőben elszórtan nagyon nagy számban különböző nagyságú, éles határú, kerekded légyszöveti képetek láthatók. Emellett valamennyi tüdő lebeny ventralis területén kiterjedt alveolaris rajzolat figyelhető meg. A kardiovaszkuláris képletek nem mutatnak eltérést. A mediastinum területén elváltozás nem látható. A mellkasi nyirokcsomók nincsenek megnagyobbodva. A mellkas fala ép






Has:

A hasüregben szabad folyadék nem látható.

A májban elszórtan több különböző nagyságú, kerekded, éles határú, kontrasztanyagot nem halmozó hypodenz terime figyelhető meg (pl. zöld nyilak). A legnagyobb a máj jobb oldalán figyelhető meg és 2,5 cm átmérőjű. A nagyobb méretű terimék periferiáján prominens erek láthatók, amelyek helyenként kanyarulatosságot mutatnak. Feltűnően jól vascularizáltak. A kisebb méretűeknél jellemzőbb, hogy vaskos, kifejezetten kontraszthalmozó faluk van és a centralis hypodenz terület jóval kisebb méretű (kék nyíl).

A lépben elszórtan több különböző nagyságú (legnagyobb 1,3 cm átmérőjű), kerekded, éles határú, kontraszthalmozást nem mutató hypodenz terime figyelhető meg (ciklámen nyilak). Van közöttük olyan is, amelyek a parietalis felszínen kidomborodnak.

A hasüregben egyéb eltérés nem figyelhető meg.



Egyéb:

A Th13 csigolya átmeneti csigolya, csak a bal oldali borda fejlődött ki. A gerincen multifokálisan enyhe-közepes spondylosis figyelhető meg. Agresszív csontelváltozásra utaló eltérés a gerinc területén, valamint a végtagok proximális részén nem látható.

Vélemény

- Különböző nagyságú hypodenz kerekded elváltozások a máj több lebenyében elszórtan – legvalószínűbben neoplasma (elsősorban hemangiosarcoma)
- Hypodenz nodularis lépelváltozások - legvalószínűbben neoplasma, nagy valószínűséggel a májban láthatóval megegyező.
- Generalizáltan nodularis és ventralisan alveolaris tüdőrajzolat – neoplasma (metastasis). Az alveolaris rajzolat háttérében vérzés, következményes-másodlagos pneumonia, és esetleg a tumoros gócok összeolvadása is állhat.
- Multifokálisan enyhe-közepes spondylosis
- Th13 átmeneti csigolya, csak a bal oldali borda fejlődött ki - incidentalis

2023. 04. 27.

Dr. Csébi Péter PhD, Diplomate ECVDI