

Beteg neve: DUGOVICS TITUSZ/TOTH, Bernadett
Születési dátum: 2016. 01. 01.
Beteg azonosítója: 000009721
Vizsgálat leírása: Gerinc
Vizsgálat dátuma: 2023. 11. 22.

Kórelőzmény: Jobb oldali hemiparesis.

Összegzés:

1. C2-C3 közepesen súlyos myelonkompresszió és jobb oldali gyöki kompresszió, jobb oldali discus extrúzió; porckorong anyaga az intervertebralis rés síkjától minimálisan cranialisan és caudalisan a gerinccsatornában.
2. L7-S1 súlyos cauda equina kompresszió, középvonali discus protrúzió.
3. C4-C5, Th9-Th10, Th12-Th13, Th13-L1, L2-L3 enyhe myelonkompresszió, discus protrúziók, C4-C5; Th9-Th10 enyhe, fokális myelonödéma; Th12-Th13 procesuss articularis osteoarthritis / malformatio; L4-L5 enyhe myelonkompresszió és bal gyöki kompresszió, discus extrúzió.
4. C3-C4, L1-L2 liquortér-kompresszió.
5. Th13-L3 közepesen súlyos ventralis spondylosis deformans.
6. Jobb lateralis májlebenyben cystosus képlet, további vizsgálata, esetleg mintavétel javasolt.
7. Jobb oldali veseciszta.
8. Lép állományában góccok; extramedullaris hematopoiesis / lymphoid hyperplasia valószínűsíthető.

Leirat:

Technikai paraméterek:

A teljes gerincoszlopról, valamint a myelonról sagittalis T2 FSE, sagittalis STIR, a thoracolumbalis szakaszcól dorsalis T2 FSE és dorsalis T2 FSE_fs, az elváltozást mutató szakaszokról transversalis T2 FSE szekvencia készült. A vizsgálat GE 1.5 T berendezéssel készült.

Anatómia: 13 bordapár és 7 lumbalis csigolya látható.

Gerincvelő / burkok / csigolyák / discusok: Az intervertebralis porckorongok T2 súlyozott szekvencián közepesen súlyos-súlyos mértékben csökkent jelintenzitásúak; dehidráltak, degeneráltak.

C2-C3 intervertebralis porckorong extrúziója látható a gerinccsatorna jobb ventrolaterális és jobb laterális részébe, közepesen súlyos myelonkompressziót és jobb gyöki kompressziót okozva. A porckorong anyaga az intervertebralis rés síkjától cranialisan és caudalisan körülbelül 3-3 mm hosszan nyomul a gerinccsatorna jobb ventrolaterális és jobb laterális részébe, közepesen súlyos myelonkompressziót okozva.

C3-C4 intervertebralis porckorong protrúziója látható a gerinccsatorna ventralis részébe, liquortér-kompressziót okozva.

C4-C5 intervertebralis porckorong protrúziója látható a gerinccsatorna ventralis részébe, enyhe myelonkompressziót okozva. Az intervertebralis rés síkjában a myelon diffúzan, kissé heterogén módon, T2

súlyozott szekvencián enyhe mértékben fokozott jelintenzitású; a myelon állományában T2 súlyozott szekvencián éles határú, szinte homogén, kifejezetten jelintenz, kerekded régiók is ábrázolódnak.

Th9-Th10 intervertebrális porckorong protrúziója látható a gerinccsatorna ventralis részébe, enyhe myelonkompressziót okozva. Az intervertebrális rés síkjában a myelon diffúzan, heterogén módon, T2 súlyozott szekvencián enyhe mértékben fokozott jelintenzitású.

Th12-Th13 intervertebrális porckorong protrúziója látható a gerinccsatorna ventralis részébe, enyhe myelonkompressziót okozva. Az intervertebrális rés síkjában jobb és bal dorsolaterálisan T2 súlyozott szekvencián alacsony, csonttal megegyező jelintenzitású képlet domborodik a gerinccsatornába, liquortér-kompressziót okozva.

Th13-L3 intervertebrális résekben közepesen súlyos ventralis spondylosis deformans látható.

Th13-L1 intervertebrális porckorong protrúziója látható a gerinccsatorna ventralis és jobb ventrolateralis részébe, enyhe myelonkompressziót okozva.

L1-L2 intervertebrális porckorong protrúziója látható a gerinccsatorna ventralis részébe, liquortér-kompressziót okozva.

L2-L3 intervertebrális porckorong protrúziója látható a gerinccsatorna ventralis részébe, enyhe myelonkompressziót okozva.

L4-L5 intervertebrális porckorong extrúziója látható a gerinccsatorna bal ventrolateralis részébe, enyhe myelonkompressziót és bal gyöki kompressziót okozva.

L7-S1 intervertebrális porckorong protrúziója látható a gerinccsatorna ventralis részébe, súlyos cauda equina kompressziót okozva. az intervertebrális rés síkjában enyhe ventralis és lateralis spondylosis deformans látható.

Mellüreg, hasüreg vizsgálati síkokban ábrázolódó területei:

A lép állományában nagy számban láthatók éles határú, homogén, 2-6 mm kiterjedésű, T2 súlyozott szekvencián alacsony jelintenzitású gócok.

A jobb laterális májlebenyben egy éles határú, kerekded alakú, T2 súlyozott szekvencián hyperintenz képlet ábrázolódik, melynek legnagyobb átmérője körülbelül 31 mm. A képlet caudomedialis részében egy T2 súlyozott szekvencián közepes jelintenzitású, körülbelül 20*18 mm kiterjedésű lézió ábrázolódik.

A jobb vese kéregállományában egy körülbelül 4 mm legnagyobb átmérőjű, éles határú, homogén, kerekded, T2 súlyozott szekvencián kifejezetten hyperintenz góc ábrázolódik.

Az epehólyag dependens oldalán a T2 súlyozott szekvencián homogén, kifejezetten hyperintenz tartalomban alacsony jelintenzitású részlet ábrázolódik.

Budapest, 2023. 11. 22.

Lelemezte: dr. Bodolay Sába

Szemlézte / Peer-review: dr. Kerekes Zoltán

Aláírta:dr. Zoltan Kerekes, DVM

Elektronikusan ellenőrizve

Aláírás napja:Leletezett 2023. 11. 22. 23:20:38