

Beteg neve: PISTIKE/MIHALYFALVINE LOVASZ, Gabriella
Születési dátum: 2018. 07. 19.
Beteg azonosítója: 000010058
Vizsgálat leírása: Gerinc
Vizsgálat dátuma: 2024. 02. 07.

Kórelőzmény: Paraplegia, mai nap óta.

Összegzés:

1. Th13-L1 súlyos myelonkompresszió, kissé bal oldali túlsúlyú, vérzéses discus extrúzió; porckorong anyaga az intervertebralis rés síkjától cranialisan és caudalisan a gerinccsatornában; súlyos, kiterjedt myelonödéma.
2. Th12-Th13 enyhe myelonkompresszió, discus extrúzió.
3. C2-C7, Th9-Th10, Th11-Th12 liquortér-kompresszió.
4. C2-C3, C7-Th6 enyhe syringomyelia.
5. Enyhén megnagyobbodott prosztata; benignus hyperplasia valószínűsíthető.
6. Jobb ln. iliaca medialis lymphadenopathia.
7. Enyhe Chiari-szerű malformatio; enyhe negyedik agykamra ventriculomegalia.

Leirat:

Technikai paraméterek:

A teljes gerincoszlopról, valamint a myelonról sagittalis T2 FSE, a thoracalis és lumbalis szakaszból sagittalis STIR, a thoracolumbalis szakaszból dorsalis T2 FSE, az elváltozást mutató szakaszokról transversalis T2 FSE szekvencia készült. A vizsgálat GE 1.5 T berendezéssel készült.

Anatómia: 13 bordapár és 7 lumbalis csigolya látható.

Gerincvelő / burkok / csigolyák / discusok: Az intervertebralis porckorongok T2 súlyozott szekvencián közepesen súlyos-súlyos mértékben csökkent jelintenzitásúak; dehidráltak, degeneráltak.

C2-C3, C7-Th6 csigolyák síkjában a canalis centralis enyhe mértékű tágulata látható.

C2-C7, Th9-Th10, Th11-Th12 intervertebralis porckorongok bedomborodása / protrúziója látható a gerinccsatornába, liquortér-kompressziót okozva.

Th12-Th13 intervertebralis porckorong extrúziója látható az intervertebralis rés síkjában a gerinccsatorna ventralis részébe, enyhe myelonkompressziót okozva. A porckorong anyaga az intervertebralis rés síkjától cranialisan és caudalisan 3-3 mm hosszan nyomul a gerinccsatorna ventralis részébe, enyhe myelonkompressziót okozva.

Th13-L1 intervertebralis porckorong extrúziója látható az intervertebralis rés síkjában a gerinccsatorna ventralis, jobb és bal ventrolateralis és bal lateralis részébe, súlyos myelonkompressziót okozva. A porckorong anyaga az intervertebralis rés síkjától cranialisan körülbelül 13 mm hosszan, Th13 csigolya

cranialis véglemezének síkjáig nyomul a gerinccsatorna ventralis, jobb és bal ventrolateralis és bal lateralis, cranialisabban bal ventrolateralis és bal lateralis részébe, súlyos, közepesen súlyos, majd enyhe myelonkompressziót okozva. A porckorong anyaga az intervertebralis rés síkjától caudalisan körülbelül 7 mm hosszan nyomul a gerinccsatorna ventralis, illetve jobb és bal ventrolateralis részébe, közepesen súlyos, majd enyhe myelonkompressziót okozva. A porckorong anyaga helyenként T2 súlyozott szekvencián kifejezett mértékben fokozott jelintenzitású. Az intervertebralis rés síkjában és attól cranialisan körülbelül egy, caudalisan körülbelül fél csigolyahossznyi kiterjedésben a myelon diffúzan, kissé heterogén módon, T2 súlyozott szekvencián kifejezett mértékben fokozott jelintenzitású.

Mellüreg, hasüreg, medenceüreg vizsgálati síkokban ábrázolódó területei: A prosztata enyhe mértékben megnagyobbodott, T2 súlyozott szekvencián kissé heterogén szerkezetű, fokozott jelintenzitású. A jobb oldali ln. iliaca medialis enyhén megnagyobbodott, szabályos szerkezetű.

Budapest, 2024. 02. 07.

Leletezte: dr. Bodolay Sába

Szemlézte / Peer-review: dr. Kerekes Zoltán

Aláírta:dr. Zoltan Kerekes, DVM

Elektronikusan ellenőrizve

Aláírás napja:Leletezett 2024. 02. 07. 23:10:31