

HEMO - VET
ÁLLATORVOSI KLINIKAI LABORATÓRIUM

1133 Budapest, Thurzó utca 5/c.

Dr. Szilágyi Attila

(, Telefon:+36 1 239 4736

Leletértelmezés) +36 30 9 615 812

Mintaszállítás Q +36 70 421 6589

Nyitvatartás:Hétfőtől-Péntekig: 9.00 - 20.00

Ügyelet: -

: www.allatorvosilabor.hu

e-mail: drszilagyiattila@allatorvosilabor.hu



Panelvizsgálatok:



- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| * Általános rutin / eb | * Véralvadási vizsgálatok |
| * Általános rutin / macska | * Pajzsmirigy-funkció |
| * Műtét előtti rutin | * Vázizom / szívizom |
| * Alap májfunkció | * Ionogram |
| * Teljes májfunkció | * Mellékvese-funkció |
| * Hasnyálmirigy funkció | * Krónikus diarrhoea |
| * Anémia profil | * Testtömegcsökkenés |
| * Polyuria / Polydipsia | * Diabetes kontroll |
| * Vese funkció | <i>Kérés esetén elég csak F X</i> |

Dátum: Budapest, 2024.05.15. 14:04:00

Minta száma: 2024 / 01480

Tulajdonos neve: Öry Flóra/Flódní

Állat adatai: beagle, 8 éves

Állat faja: Kutya

Chipszám:

Beküldő állatorvos:	HÁMORI ZSOLT DR
Cím:	1015 BUDAPEST , BATTHYÁNY U. 50
Telefon:	2136874 06-30-933-10-25
Fax :	2122104

Szövetteni vizsgálat:

Eredete: Bal comb laterális részén lévő növedék

. Kórszövetteni leírás, lelet:

•A H.-E.-festett, jól értékelhető, sejtgazdag minta kórszövetteni, fénymikroszkópos vizsgálata során: az elváltozás-mentes hám-réteg alatt, a dermalis rétegben, stroma-gazdag, localisan infiltráló, jól mikroerezett, állományában diffúz vizenyő jeleit mutató, azonos sejtalaktani megjelenésű, rosszindulatú, elsődleges, rotundocellularis (kerek-sejtes mikromorfológiájú) bőrtumort, low grade (grade I-es, kis) malignitási fokozatú, differenciált mastocytomát figyeltünk meg, oedemás stromájában diffúz eosinophil granulocytás beszűrődéssel. A monomorph kerek, ovaloid tumorsejtek dominánsan centralis helyeződésű, éles határú, kerekded, euhromaticus, finoman granularis maggal, 1-2 nem prominens basophil magvacskával, bőséges, eosinophil, granulum-gazdag cytoplasmával rendelkeztek, egyes területeken a szoros egymáshoz préselt állapot miatt szögletes, polygonalis alakot vettek fel. Mitoticus aktivitást nem észleltünk 10 nagy nagyítású látómezőben. Vér- és nyirokérbetörés jeleit nem észleltük. A tumor állományában microcystás verejtékmirigy-tágulatot és váladék-pangás jeleit érzékeltük. A megvizsgált sebészi szélek tumor-mentesek voltak.

Diagnózis, kórisme:

•Grade I-es, low grade, kis malignitási fokozatú, differenciált, rosszindulatú, dermalis mastocytoma (korábbi elnevezés: hízósejtes daganat), vér- és nyirokérbetörés jelei nélkül, apocrin cystomatosis-sal.

Vélemény, javaslat:

- Multiplex független megjelenésre hajlamos bőr-tumor.
- Javasolt a sentinel nyirokcsomó vizsgálata, a postoperatív kontroll, az évenkénti szűrővizsgálat.
- Szakirodalom alapján, 2cm-es laterális sebészi széllal és egy pólyányi mélységű sebészi alappal épben, recidíva-mentesen eltávolítható tumor. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14736068/>
- Multiplex megjelenés, vagy nagy méret esetén, a tumorsejtek fokozott hisztamin termelési kapacitása miatt javasolt a gyomorvédő, savcsökkentő-kezelés. A mastocytoma-sejtek fokozott heparin-termelése miatt javasolt véralvadási paraméterek kontrollja. A fokozott eosinophil-kemoattraktáns-faktor termelés miatt javasolt a paraneoplasticus hypereosinophilia kontrollja.

Budapest, 2024.06.07. 11:20:40

Validálta:

Dr. Szilágyi Attila

HEMO-VET Kft.
Allatorvosi Klinikai Laboratórium
Dr. Szilágyi Attila
1133 Budapest, Thurzó u. 5/c
☎ 1 239 4736, 1 790 5923, 06 309 615 812

