



FuzioVet Állatkórház

1112 Budapest, Budaörsi út 146.

Tel.: +36 30 469 9459

E-mail: info@fuziovet.hu

Web: www.fuziovet.hu

MRI/CT vizsgálati lelet

Állat kód: 183427

Tulajdonos: Bozó Barna

Páciens:

Név: Lola

Faj: kutya

Fajta: border collie

Születési dátum: 2016.09.11.

Ivar: szuka

Testtömeg: 25 kg

Vizsgálat dátuma: 2024.10.28.

Anamnesis / klinikai tünetek

Pénteken este, mikor hazaértek a gazdik, sántított a bal hátsó lábára. Tegnap voltak állatorvosnál, kapott SZTEROID injekciót. Romlott az állapota, este már alig bírt felkelni. Bal hátsó lábát többnyire húzza. Rendelőben járóképes, de kifejezett hátsó testfél gyengeség, ataxia látható. A lumbalis gerincszakasz nyomásra érzékeny. A bal oldalon a flexor reflex hyporeflexias, a felületes és mély fájdalomérzet megtartott, a propriocepcio bilaterálisan kiesett.

Bal caud. emlő előtt egy borsónyi méretű, tömött tapintatú szövetszaporulat érezhető.



Képalkotó lelet

A TL gerincről MRI vizsgálat készült (T2 sag., T2 GRE dors., az L3-L5 területről T2, T1 és T1 kontrasztos trans. mérések). A TL gerincről natív CT vizsgálat készült.

A csigolyák alakja és illeszkedése szabályos, a véglemezek épek. Az L4-L6 területen közepes mértékű spondylosis látható. Agresszív csontelváltozás nem látható. A porckorongok normális jelintenzitásúak és volumenűek a T2 súlyozott méréseken. Az L5/L6 csigolyaköznél a gerincvelő bal oldalán egy apró meszesedés látható (zöld nyíl). A gerincsatornában kóros tartalom nem figyelhető meg. A gerincvelő állományában kóros jelintenzitásváltozás nem ábrázolódik. A kilépő idegek nincsenek megvastagodva, lefutásuk szabályos. Neuroforaminostenosis nem figyelhető meg. A paravertebrális izomzat szimmetrikus,

atrophia vagy jelintenzitásváltozás nem figyelhető meg. A m. iliopsoas normális volumenű és jelintenzitású, szimmetrikus megjelenésű. A retroperitoneum, hasüreg és medence látható részén eltérés nem figyelhető meg.

A csigolyák alakja és illeszkedése szabályos, a véglemezek épek. Agresszív csontelváltozás nem látható. A porckorongok normális jelintenzitásúak és volumenűek a T2 súlyozott méréseken. A gerinccsatornában kóros tartalom nem figyelhető meg. A gerincvelő állományában kóros jelintenzitásváltozás nem ábrázolódik. A paravertebralis lágyszövetek területén eltérés nem figyelhető meg.



A bal vesében egy 1,3 cm nagyságú ciszta látható. A hasüregben egyéb eltérés nem figyelhető meg.

A mellkasban kóros elváltozás nem látható.

Vélemény

- L4-L6 spondylosis deformans – incidentalis
- L5/L6-nál apró mineralisatio a durában – valószínűleg incidentalis
- A gerinc területén a klinikai tüneteket indokló kóros morfológiai eltérés nem látható.
- Bal vesében ciszta – jelenleg incidentalis

2024. 10. 28.

Dr. Csébi Péter PhD, Diplomate ECVDI