

Kórlap:

Dátum: 2025.01.20.

Klinika, orvos: Kisállat Ambulancia Makó, Dr. Sebő Levente

[Anamnesis]

Múlthét csütörtök óta hátsó testfél gyengesége van. Kezelte Szőke Dr. meloxicámmal, kis kezdeti javulás után romlott az állapota, hétvége óta imbolyog.

[Symptoma]

Neurológiai vizsgálat:

Mentál státusz: Ép

Járása: Járóképes hátsó testfél paraparesis

Agyi reflexek: Normoreflexia

Gerinc: A nyak ad maximum oldalra hajlítására, nyújtására, hajlítására, rotálására fájdalmat nem jelez. **A thoraco-lumbalis gerinc nyomásra érzékeny**

Elülső végtag:

Propriocepció: A Hopping teszt, asztalhelyezési reflex, korrigálási reflex megtartott mko elülső végtagon.

Gerincvelői izom-ín reflexek: A biceps brachii, -triceps, -extensor carpi radialis és flexor reflexek megtartottak, normoreflexiások mko

Hátsó végtag:

Propriocepció: A Hopping teszt, asztalhelyezési reflex, korrigálási reflex **késleltetettek** mko hátsó végtagon.

Izom-ín reflexek:

A biceps femoris, -patella, -tibialis cranialis, - n. ischiadicus és flexor reflex **hyperreflexiások** mko, A perinealis reflex megtartott

A Panniculus reflex megszűnik az L2-es csigolya vonalától hátrafelé.

Összegzés: II/V-ös gerincvelői lézió a T3-L3 gerinc szakaszon

MRI vizsgálat: A thoracalis, lumbalis, illetve lumbo-sacralis gerincről MRI vizsgálat készült T2 sagitalis, illetve az elváltozást mutató szakaszon T2 transversalis, súlyozott szekvenciákon.


Leírás:

A porckorongok enyhe, közepes, súlyos mértékben dehidrááltak.
Th12-Th13 intervertebrális discus extrúzió, súlyos mértékű myelon compressio. A kilövellt porcanyag Th12-Th13 intervertebrális csigolyaköztől kezdődően, Th13-es csigolya cranialis 1/3-áig, lateralis térfoglalást mutat, a myelont jobb oldalról komprimálja.

Összegzés:

Th12-Th13 discus hernia, súlyosfokú myelon compressio, jobb oldali dominancia,
Hansen I-es típusú porckorongsér

[Therapia]



Th12-Th13 jobb oldali haemilaminectomia

RL inf.

Torphadine inj.

Cerenia inj.

Synulox inj.

Onsior inj.

Otthonra:

Clavaseptin 250 mg 2x 1/2 tbl, 10 napig.

Carprox 50 mg 1x 1/2, 6 napig

[Megjegyzés, kezelési javaslat]

A lábraállásig fizioterápia javasolt, varratszedés 2 hét múlva esedékes.