

CT LELET

Állat Bajkál

kutya, moszkvai őrkutya, hím,
trikolor
Chip code:
900118000260748
Születési időpont: 2016.02.19
Állat kód: 1670-4329

Tulajdonos

Bárdi Nóra
7632 Pécs
Páfrány u. 46
Tel.: (72) , (72) , 06204822880
Email cím.: norcsi73@gmail.com

Tünetek

"Nehezen ül le - ez az egyetlen, de kifejezett panasz. Fizioterapeuta szerint a válla is problémás, ezért erről a régióról is készült felvétel. Leüléskor hirtelen fájdalom - kolléga idegbecsípődésre gyanakszik. Dr. Horváth Éva betege. 9 éve ismert csípő DP-ás beteg. 3,5 éve összejtkezelés történt, utána rosszabb lett. Korábban discospondylitis, CEC került megállapításra MR-rel, kb. 3 éve operáltuk CEC miatt."

Vizsgálat ideje

2025.04.22.

Referáló

dr. Szabó Lajos, Orthovet, Mohács

CT sorozatok

teljes gerinc natív és posztkontrasztos sorozat, 1,25 mm helical

Képmínőség

megfelelő

Pozíció

supine

Elváltozások

- Normál számú nyak-, hát-, és ágyékcsgolyó.
- A thoracolumbalis átmenetnél és az ágyéki gerinc területén több ponton ventralis protrusiók láthatók, így a T12-L4 szakaszon valamennyi csigolyaközben. Ugyanitt a gerincvelő jobb irányú elmozdulása látható a gerinccsatornán belül.
- A lumbosacralis résben vákuum fenomén látható, a véglemezek egyenetlen felszínűek, az intervertebralis rés igen szűk, a véglemezek szinte érintkeznek. Ugyanitt ventralisan spondylosis deformans látható. Dorsalisan korábbi laminectomia jelei láthatók, a terület békés, az epiduralis zsír a canalisban megtartott, direkt cauda equina kompresszióra utaló jel nincs.
- A lumbosacralis foramenek mindkét oldalon beszűkültek.
- A medence deformált, a jobb oldalon korábbi pelvis osteotomia jelei láthatók (?).
- Mindkét csípőízület arthroticus, a bal oldalon intraarticularis vákuum fenomén is látható.
- Egyéb gerincszakaszokon releváns kóros eltérés nem mutatkozik.
- A mellkas és a hasüreg látótérbe került területein érdemi eltérés nem figyelhető meg.


Konklúzió

- A fájdalom forrásaként felmerül a denudálódott lumbosacralis ízület, a beszűkült a lumbosacralis foramenek okozta ideggyöki kompresszió, esetlegesen a krónikus ágyéki protrusiók valamelyike, vagy a csípőízületek arthrosis.



CT képek

Bajkál, moszkvai , 25. 04.22.



Budapest, 2025-04-22


dr. Arany-Tóth Attila